# 外来がん薬物治療　副作用状況確認票 【八尾薬薬連携版】

様（確認日：　　年　　月　　日）

| 症状 | 0 | グレード1 | グレード2 | グレード3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発熱 | なし | 38.0-39.0℃ | 39.1℃以上 | 40℃以上 | |
| 食欲不振 | なし | 食欲は落ちているが、<br>食事量は変わらない | 食事量が減った<br>（経口栄養剤を補充） | 食事や水分を口からとることができない | |
| 吐き気 | なし | 気持ち悪いが食べられる | 食事量が減った<br>（経口栄養剤を補充） | 食事や水分を口からとることができない | |
| 嘔吐 | なし | 治療の必要なし | 外来での治療が必要 | 入院での治療が必要<br>（持続点滴、TPN） | |
| 口内炎 | なし | 軽い症状があるが、<br>食事に影響はない | 痛みや腫れがあり、<br>少し食事がしづらい | 痛みが強く、食べることができない | |
| 味覚異常 | なし | 味覚の変化があるが、<br>食生活は変わらない | 味覚の変化があり、<br>食生活が変わる | | |
| 倦怠感 | なし | だるさがある、<br>または元気がない | 日常生活に支障がある | | |
| 下痢 | なし | 普段より多い | 普段より4-6回多い | 普段より7回以上多い | |
| 便秘 | なし | 時々便秘があり、<br>下剤を使う | 常に便秘があり、<br>下剤を使う | 下剤を使用しても排便がない<br>（最終排便日：　　） | |
| しびれ | なし | 軽い症状があるが、日常生活に支障はない | 症状があり、家事や仕事に支障がある | 症状が強く、身の回りの日常生活動作に支障あり | 部位： |
| 痛み | なし | 軽度の疼痛 | 中等度の疼痛<br>日常生活動作に支障なし | 高度の疼痛<br>日常生活動作に制限あり | 部位： |
| 皮膚乾燥 | なし | 体表面積の10%未満<br>紅斑や掻痒は伴わない | 体表面積の10-30%<br>紅斑又は掻痒を伴う | 体表面積の30%以上<br>掻痒を伴う | 部位： |
| ざ瘡様皮疹 | なし | 紅色小丘疹と膿疱の散在、掻痒や痛みなし | 痛みや掻痒を伴う紅色小丘疹と膿疱の散在 | 広範囲で激しい痛みや掻痒を伴う紅色小丘疹と膿疱の散在 | 部位： |
| 掻痒 | なし | 限局的<br>局所的治療を要する | 広範囲で間欠的<br>掻破による皮膚変化あり<br>内服治療を要する | 広範囲で常時<br>睡眠や日常生活に制限あり。ステロイドの全身投与等を要する | 部位： |
| 爪囲炎 | なし | 軽度の発赤や腫脹あり | 発赤・腫脹により痛みを生じる | 高度の腫脹、発赤、肉芽形成を認め、激しい痛みがある | |
| 手足症候群 | なし | 疼痛を伴わない軽度な皮膚の変化、皮膚炎 | 疼痛を伴う皮膚の変化 | 疼痛を伴う高度の皮膚の変化 | |
| 浮腫 | なし | 軽度の腫脹でよく見ると気付く | 見てすぐわかる状態 | 輪郭の異常が著明 | 部位： |