薬剤情報

2023-11月　No.7

1．採用薬品情報（2023/10/30　薬事審議会）

1）新規採用薬剤

①　酢酸亜鉛錠「サワイ」２５ｍｇ、５０ｍｇ
薬価：25mg　￥100.6　　50mg　￥157.6

【薬効分類】低亜鉛血症治療薬、ウィルソン病治療薬（銅吸収阻害薬）
【用法・用量】
〈ウィルソン病〉
成人には、亜鉛として、通常1回50mgを1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状に応じて適時増減するが、最大投与量は1日250mg（1回を1日5回投与）とする。
6歳以上の小児には、亜鉛として、通常1回25mgを1日3回経口投与する
1歳以上6歳未満の小児には、亜鉛として、通常1回25mgを1日2回経口投与する
なお、いずれの場合も、食前1時間以上又は食後2時間以上あけて投与すること
〈低亜鉛血症〉
通常、成人および体重30kg以上の小児には、亜鉛として1回25～50mgを開始用量として1日2回経口投与する。

1）．　成人及び体重30kg以上の小児：最大投与量（1日あたり）150mg
（1回50mgを1日3回）
2）．　体重10kg以上30kg未満の小児：最大投与量（1日あたり）75mg
（1回25mgを1日3回）
3）．　体重10kg未満の小児：最大投与量（1日あたり）25mg
（1回12.5mgを1日2回、又は1回25mgを1日1回）

2）後発品・メーカー変更・規格追加薬剤

・オキサリプラチン点滴静注「NK」50mg、100mg、200mg
・ピコスルファートナトリウム内用液0..75%「イワキ」
・ファモチジンOD錠「トーワ」10mg、20mg
・ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」100mg、400mg
・リツキシマブBS点滴静注「KHK」100mg、500mg

3）削除品目

・エルプラット点滴静注（オキサリプラチン点滴静注「NK」を採用するため）
・ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」
（ピコスルファートナトリウム内用液0..75%「イワキ」を採用するため）
・ファモチジンD錠「EMEC」（ファモチジンOD錠「トーワ」を採用するため）
・リツキサン点滴静注用（リツキシマブBS点滴静注を採用のため）

2．新規 院外処方薬（院外処方箋でのみ処方可）

- コレアジン錠12.5ｍｇ
- フルルバンパップ40mg
- アルジオキサ100ｍｇ錠
- コレチメント錠９ｍｇ
- コンベック軟膏5%

3．医薬品安全性情報

なし

4．添付文書改訂情報

なし