NSCLC　Amivantamab＋CBDCA＋PEM療法【C2】

	Day1
注射	■---【注射】 ■CBDCA+PEM+ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ療法■ N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ) … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時,ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap125mg服用 ② ■ペメトレキセド(PEM) N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (10)分かけて (500mg/㎡) ③ ■カルボプラチン(CBDCA) N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて (AUC:5) ※ﾗｲﾌﾞﾘﾊﾞﾝﾄ投与30分前にｶﾛﾅｰﾙ500mg1錠,ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用 ④ ■ﾗｲﾌﾞﾘﾊﾞﾝﾄ(amivantamab) N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きルートを使用 (80kg未満:1400mg,80kg以上:1750mg/body) (125)ml/時間
投薬	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ(80mg)「NK」 … 1cap 1日1回　朝食後 (化学療法実施の翌日から2日間) 2日