NSCLC　Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+PEM療法【C1-4】(21日毎)

	Day1
注射	■---【注射】 ■D+T+CBDCA+PEM療法■ ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ) … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時、ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ② ■イジュド(Tremelimumab) (75mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※ｲｼﾞｭﾄﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ ③ ■イミフィンジ(Durvalumab) (1500mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ ※体重30kg以下の場合は1回20mg/kgに変更必要 ④ ■ペメトレキセド(PEM) (500mg/㎡) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (10)分かけて ⑤ ■カルボプラチン(CBDCA) (AUC:5) N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて
投薬	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ(80mg)「NK」 … 1cap ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 1日1回　朝食後 2日