NSCLC　Durvalumab+Tremelimumab維持療法【C5、C6】(56日)

※Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nab-PTX 療法【C1-4】後の維持療法

※Durvalumab+Tremelimumab維持療法【C5、C6】後はC7-Durvalumab維持療法(28日)へ

	Day1
注射	■---【注射】 ① ■イミフィンジ(Durvalumab) (1500mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※体重30kg以下の場合は1回20mg/kgに変更必要

Day29

■---【注射】
■Durvalumab+Tremelimumab維持■-day29
①
■イジュド（Tremelimumab）（75mg/body）
N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶
末梢点滴 … 1
（60）分かけて
※インラインフィルター付きルートを使用
※ｲｼﾞｭﾄﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ
②
■イミフィンジ（Durvalumab）（1500mg/body）
N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶
末梢点滴 … 1
（60）分かけて
※インラインフィルター付きルートを使用
※体重30㎏以下の場合は1回20mg/㎏に変更必要