NSCLC Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持療法【C5、C6】(56日)

※C7-Durvalumab+PEM維持療法(28日)へ

	Day1	Day29
注射	■---【注射】 ■Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持■-day1 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A N／S 50mL(大塚)ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■イミフィンジ(Durvalumab) (1500mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※体重30kg以下の場合は1回20mg/kgに変更必要 ※ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ ③ ■ペメトレキセド(PEM) (500mg/㎡) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (10)分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 ■Durvalumab+Tremelimumab+PEM維持■-day29 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A N／S 50mL(大塚)ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■イジュド(Tremelimumab) (75mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※ｲｼﾞｭﾄﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ ③ ■イミフィンジ(Durvalumab) (1500mg/body) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 (60)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※体重30kg以下の場合は1回20mg/kgに変更必要 ※ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ投与終了後、ﾒｲﾝのNSで5分間ﾌﾗｯｼｭ ④ ■ペメトレキセド(PEM) (500mg/㎡) N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (10)分かけて 末梢点滴 … 1 (500mg/㎡)
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回 朝昼食後 ※点滴施行翌日から2日間	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回 朝昼食後 ※点滴施行翌日から2日間