NSCLC　Osimertinib＋CDDP＋PEM療法

	Day1
注射	■---【注射】 ■Osimertinib＋CDDP＋PEM療法■ ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 (2)時間かけて ② ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 3A ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ) … 1袋 開始時間：12時0分 (15)分かけて ※開始時,ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap125mg服用 ③ ■ペメトレキセド（PEM） （500mg/㎡） N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (10)分かけて ④ N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (30)分かけて ⑤ ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL(袋) … 0.66袋 ※200mLのみ投与 (1)時間かけて ⑥ ■ランダ（CDDP） （75mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B (90)分かけて ⑦ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B (1)時間かけて ⑧ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 100ml／h ⑨ ソルデム3A 500mL（維持輸液）… 1袋 100ml／h
投薬	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ（80mg）「NK」… 1cap （2日目と3日目 の2日間 ） 1日1回　朝食後 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （2日目、3日目、4日目 の3日間 ） 1日2回　朝昼食後
	■---【投薬】 タグリッソ錠　80mg/日　※連日