NSCLC　Atezo＋CBDCA＋nabPTX療法（21日毎）

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■テセントリク（Atezolizumab） （1200mg/body） N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 初回:60分,2回目以降:30分 ※Atezo：ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用 ③ ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 （30）分かけて ※nab-PTX：ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄ禁止 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 （60）分かけて	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日		