NSCLC　CBDCA＋nab-PTX療法（21日毎）

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ ③ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン（nab-PTX）（100mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日		