NSCLC CDDP＋S1療法(28日毎)

	Day1	Day8
注射		■---【注射】 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L (点滴用 1L) … 1袋 [要希釈]硫酸Mg液(20mEq/20mL) … 1管 (2)時間かけて 末梢点滴 … 1 ※ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ③ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 末梢点滴 … 1 ※200mlのみ投与 (60)分かけて ④ ■ランダ(CDDP)(60mg/㎡) N/S 500mL (点滴用)「ﾃﾙﾓ」 … 1B (90)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑤ N/S 500mL (点滴用)「ﾃﾙﾓ」 … 1B (60)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 (60)分かけて 末梢点滴 … 1
内服	■---【投薬】 ■S－1 ____～1.24m2：80mg/day/body 1.25～1.49m2：100mg/day/body 1.50m2～____：120mg/day/dody 1日2回 朝夕食後 21日	■---【投薬】 イメンドｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap (化学療法実施の翌日から2日間) 1日1回 朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 (化学療法実施の翌日から3日間) 1日2回 朝昼食後 3日