NSCLC　CDDP＋VNB療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 *VNR終了後、ﾒｲﾝの生食でﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 （120）分かけて 末梢点滴 … 1 ※CDDP投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ナベルビン(VNR)（25mg/㎡；BSA） N／S 50mL … 1B （5）分かけて 末梢点滴 … 1 ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 末梢点滴 … 1 （60）分かけて ※200mLのみ投与 ⑤ ■ランダ（CDDP）（80mg/㎡；BSA） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 *VNR終了後、ﾒｲﾝの生食でﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 ① ■ナベルビン(VNR)（25mg/㎡；BSA） N／S 50mL … 1B （5）分かけて 末梢点滴 … 1
内服	■---【投薬】 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日	