NSCLC　CPT11療法（28日毎）

		Day1	Day8	Day15
投薬	点滴・注射	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】末梢点滴 ■イリノテカン（CPT-11）（100mg/㎡；BSA） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】末梢点滴 ■イリノテカン（CPT-11）（100mg/㎡；BSA） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】末梢点滴 ■イリノテカン（CPT-11）（100mg/㎡；BSA） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1
	内服	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日