NSCLC　GEM＋S-1療法(21日毎)

		Day1	Day8	Day15
投薬	点滴・注射薬		■---【注射】 末梢点滴 … 1 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【末梢側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【末梢側管】 ■ゲムシタビン(GEM)(1000mg/㎡;BSA) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【末梢側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【末梢側管】 ■ゲムシタビン(GEM)(1000mg/㎡;BSA) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて
	内服薬	■---【投薬】 ■S－1 ____～1.49m2:80mg/day/body 1.50～1.83m2:100mg/day/body 1.84m2～____:120mg/day/dody 1日2回　朝夕食後 7日	■---【投薬】 ■S－1 ____～1.49m2:80mg/day/body 1.50～1.83m2:100mg/day/body 1.84m2～____:120mg/day/dody 1日2回　朝夕食後 7日	