NSCLC　Necitumumab＋CDDP＋GEM療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用） 硫酸Mg液（20mEq/20mL） 末梢点滴 （2）時間かけて オルガドロン注射液3.8mg 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL （15）分かけて 末梢点滴 ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ポートラーザ（Necitumumab）… 800mg N/S 250mL 末梢点滴 （60）分かけて ※終了後、生理食塩液でフラッシュ ゲムシタビン（GEM）（1250mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液　200mL （60）分かけて 末梢点滴 ランダ（CDDP）（75mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」 （90）分かけて 末梢点滴 N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」 末梢点滴 （60）分かけて ｿﾙｱｾﾄF輸液（酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ）500mL 末梢点滴 （60）分かけて	オルガドロン注射液3.8mg 2A N／S 50mL （15）分かけて 末梢点滴 ポートラーザ（Necitumumab）… 800mg N/S 250mL （60）分かけて 末梢点滴 ※終了後、生理食塩液でフラッシュ ゲムシタビン（GEM）（1250mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴
内服	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （2日目と3日目 の2日間） 1日1回　朝食後 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠4mg … 2錠 （2日目、3日目、4日目 の3日間） 1日2回　朝昼食後	