NSCLC　Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法（42日）

	Day1	Day22
注射	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② ■ヤーボイ（Ipilimumab）（1mg/kg） N／S 50mL … 1B （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③ ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A グラニセトロン点滴 3mg/50mL｢HK … 1袋 （15）分かけて ④ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （10）分かけて ⑤ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A グラニセトロン点滴 3mg/50mL｢HK … 1袋 （15）分かけて ③ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （10）分かけて ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて
投薬	▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後	▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後