NSCLC　Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法（42日）

	Day1	Day22
注射	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② ■ヤーボイ（Ipilimumab） 1mg/kg） N／S 50mL … 1B （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③ ▼オルガドロン注射液3.8mg … 5A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注） … 1管 グラニセトロン点滴 3mg/50mL｢HK … 1袋 （30）分かけて ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用 ④ ■パクリタキセル（PTX）（200mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B （3）時間かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ⑤ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 5A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注） … 1管 グラニセトロン点滴 3mg/50mL｢HK … 1袋 （30）分かけて ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用 ③ ■パクリタキセル（PTX）（200mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B （3）時間かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて
投薬	▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法実施の翌日から2日間）	▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法実施の翌日から2日間）