NSCLC Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM療法（42日）

	Day1	Day22
注射	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② ■ヤーボイ（Ipilimumab）（1mg/kg） N／S 50mL … 1B （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③ 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 ［要希釈］硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 （2）時間かけて ④ ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ⑤ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （10）分かけて ⑥ ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 ※200mLのみ投与 （1）時間かけて ⑦ ■ランダ（CDDP）（75mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （90）分かけて ⑧ N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （1）時間かけて ⑨ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （1）時間かけて	① ■オプジーボ（Nivolumab） … 360mg N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて ※インラインフィルター付きのルートを使用 ② 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 ［要希釈］硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 （2）時間かけて ③ ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ④ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （10）分かけて ⑤ ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL ※200mLのみ投与 （1）時間かけて ⑥ ■ランダ（CDDP）（75mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （90）分かけて ⑦ N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （1）時間かけて ⑧ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （1）時間かけて
投薬	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回 朝食後 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回 朝昼食後	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回 朝食後 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回 朝昼食後