NSCLC Pembro＋CBDCA＋nab-PTX療法(21日毎)

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■キイトルーダ(Pembrolizumab) (200mg/body) N／S 50mL … 1B 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※Pembro:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用 ③ ■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※nab-PTX:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄ禁止 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※ ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 ※ ④ ■カルボプラチン(CBDCA) (AUC:6) N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※ ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 ※	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ 戻す 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※ ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 ※
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 (化学療法実施の翌日から2日間) 1日2回 朝昼食後 2日		