NSCLC Pembro＋CDDP＋PEM療法(21日毎)

	Day1
注射	■---【注射】 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 (2)時間かけて 末梢点滴 … 1 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ③ ■キイトルーダ（Pembrolizumab） （200mg/body） N／S 50mL … 1B 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ④ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 (10)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑤ N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.66瓶 ※200mLのみ投与 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ ■ランダ（CDDP）（75mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B 末梢点滴 … 1 (90)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑧ N/S 500mL（点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B (1)時間かけて 末梢点滴 … 1 ⑨ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 (1)時間かけて
投薬	■---【投薬】 イメンドカプセル 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回 朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回 朝昼食後 3日