NSCLC wCBDCA＋nab-PTX療法(21日毎)

| | Day1 | Day8 |
|---|---|---|
| 注射 | ■---【注射】<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>開始時・終了時<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK<br>… 1袋<br>(15)分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>末梢点滴 … 1<br>(30)分かけて<br>※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ<br>戻す<br>末梢点滴 … 1<br>N／S 100mL … 1瓶<br>※ ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 ※<br>③<br>■カルボプラチン(CBDCA) (AUC:2)<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>(60)分かけて | ■---【注射】<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>開始時・終了時<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK<br>… 1袋<br>(15)分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>末梢点滴 … 1<br>(30)分かけて<br>※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ<br>戻す<br>末梢点滴 … 1<br>N／S 100mL … 1瓶<br>※ ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 ※<br>③<br>■カルボプラチン(CBDCA) (AUC:2)<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>(60)分かけて |
| 投薬 | ■---【投薬】<br>▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠<br>(化学療法実施の翌日から2日間)<br>1日1回 朝食後<br>2日 | ■---【投薬】<br>▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠<br>(化学療法実施の翌日から2日間)<br>1日1回 朝食後<br>2日 |