NSCLC　wPTX＋wCBDCA療法（28日毎）

		Day1	Day8	Day15
投薬	点滴・注射	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）…1管 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（60mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】末梢点滴 ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC 2.0） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）…1管 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（60mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】末梢点滴 ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC 2.0） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）…1管 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（60mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】末梢点滴 ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC 2.0） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1
	内服	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日