NSCLC　術後　CDDP＋VNR療法（21日毎）

	Day1	Day2	Day8
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 *VNR終了後、ﾒｲﾝの生食でﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 開始時間：10時0分 （120）分かけて 末梢点滴 … 1 ※CDDP投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 開始時間：12時0分 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ナベルビン(VNR)（25mg/㎡） N／S 50mL … 1B 開始時間：12時15分 （5）分かけて 末梢点滴 … 1 ※VNR終了後、ﾒｲﾝの生食でﾌﾗｯｼｭ ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 開始時間：12時30分 末梢点滴 … 1 （60）分かけて ※200mLのみ投与 ⑤ ■ランダ（CDDP）（80mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B 開始時間：13時30分 （90）分かけて 末梢点滴 … 1 ※全量500mLに調製 ⑥ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B 開始時間：15時0分 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 開始時間：16時0分 末梢点滴 … 1 100ml／h ⑧ ソルデム3A 500mL … 1袋 末梢点滴 … 1 100ml／h	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ注10mg/2mL(=ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注 … 1A ① 100ml／h 末梢点滴 … 1 ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ注10mg/2mL(=ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注 … 1A ② 100ml／h 静脈内注射 … 1 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 開始時間：10時0分 ③ 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 ④ 100ml／h	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 *VNR終了後、ﾒｲﾝの生食でﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 ① ■ナベルビン(VNR)（25mg/㎡） N／S 50mL … 1B （5）分かけて 末梢点滴 … 1
内服		■---【投薬】 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日	