NSCLC（non sq） CDDP＋GEM＋Bmab療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 開始時間：10時0分 末梢点滴 … 1 （2）時間かけて ① ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞcap125mg服用 ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.66瓶 末梢点滴 … 1 （60）分かけて ※200mLのみ投与 ⑤ ■ランダ（CDDP）（80mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ ■アバスチン(BV)（15mg/kg） N／S 100mL … 1瓶 初回：90分 2回目：60分 3回目から30分 末梢点滴 … 1 ⑦ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑧ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 末梢点滴 … 1 （60）分かけて	N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1
内服	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回 朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回 朝昼食後 3日	