NSCLC（non sq） PEM＋CDDP療法

	Day1
注射	■---【注射】 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L （点滴用 1L） … 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL） … 1管 （2）時間かけて 末梢点滴 … 1 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg服用 ③ ■アリムタ（PEM）（500mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （10）分かけて 末梢点滴 … 1 ④ N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑤ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.66瓶 ※200mLのみ投与 （1）時間かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ ■ランダ（CDDP）（75mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B 末梢点滴 … 1 （90）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （1）時間かけて 末梢点滴 … 1 ⑧ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （1）時間かけて
投薬	■---【投薬】 イメンドカプセル 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日