SCLC CPT-11療法(28日毎)

		Day1	Day8	Day15
投薬	点滴・注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 末梢点滴 … 1 ■イリノテカン(CPT-11)(100mg/㎡) N/S 500mL (点滴用)「ﾃﾙﾓ」 … 1B (90)分かけて ②	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 末梢点滴 … 1 ■イリノテカン(CPT-11)(100mg/㎡) N/S 500mL (点滴用)「ﾃﾙﾓ」 … 1B (90)分かけて ②	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 末梢点滴 … 1 ■イリノテカン(CPT-11)(100mg/㎡) N/S 500mL (点滴用)「ﾃﾙﾓ」 … 1B (90)分かけて ②
	内服	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回 朝昼食後 (化学療法の翌日から2日間) 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回 朝昼食後 (化学療法の翌日から2日間) 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回 朝昼食後 (化学療法の翌日から2日間) 2日