尿路上皮癌　GC（GEM＋CDDP）療法（21日毎）

	Day1	Day2	Day8
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 開始時・終了時 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L （点滴用 1L） … 1袋 ［要希釈］硫酸Mg液（20mEq/20mL） … 1管 ① （2）時間かけて ※ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 末梢点滴 … 1 ② ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 （30）分かけて 200ml 末梢点滴 … 1 ④ ■ランダ（CDDP）（70mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （90）分かけて ※全量500mLとなるよう調製 末梢点滴 … 1 ⑤ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （60）分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 開始時・終了時 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて
内服		■---【投薬】 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日	