尿路上皮癌　GC(GEM+CDDP)療法(28日毎)

	Day1	Day2	Day3	Day8	Day15
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 【主管】ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ時～24:00まで持続 末梢点滴 … 1 【側管 ①】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 【側管 ②】 ■ゲムシタビン(GEM)(1000mg/㎡;BSA) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液(20mEq/20mL) … 1管 【主管 ①】0:00～12:00 ※ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 末梢点滴 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 【主管 ②】12:00～24:00 末梢点滴 … 1 【側管 ①】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 【側管 ②】 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 (60)分かけて 200ml 末梢点滴 … 1 【側管 ③】 ■ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)(70mg/㎡) N/S 500mL（点滴用)「ﾃﾙﾓ」… 1B (120)分かけて ※全量500mLとなるよう調製 末梢点滴 … 1 【側管 ④】 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 (120)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 【主管】0:00～12:00(または抜針時まで)	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 開始時・終了後に 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン(GEM)(1000mg/㎡;BSA) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 開始時・終了後に 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン(GEM)(1000mg/㎡;BSA) N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて
内服			■---【投薬】 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap (化学療法実施の3日目と4日目) 1日1回　朝食後 2日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 (化学療法実施の3日目から3日間) 1日2回　朝昼食後 3日		