尿路上皮癌　Nivolumab＋GEM+CDDP療法【C1-6】(21日毎)

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 ■Nivo+GEM+CDDP療法■-day1 【主管 ①】 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 【主管 ②】12:00～24:00 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 ① ■オプジーボ（Nivolumab）（360mg/body） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (30)分かけて ※ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用 (3週毎) ② ｱﾛｶﾘｽ点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 3A ﾊﾞﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ)… 1袋 (30)分かけて ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (30)分かけて ④ ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL(袋) 200mL (30)分かけて ⑤ ■ランダ（CDDP）（70mg/㎡） N/S 500mL（点滴用)「ﾃﾙﾓ」… 1B (120)分かけて ※全量500mLとなるよう調製 ⑥ 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 (120)分かけて	■---【注射】 ■Nivo+GEM+CDDP療法■-day8 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A N／S 50mL(大塚)ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 (30)分かけて
内服	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 (2日目、3日目、4日目 の3日間) 1日2回 朝昼食後	