尿路上皮癌　Nivolumab＋GEM＋CBDCA療法（21日毎）【CDDP中止後のみ使用可】

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 ■Nivo+GEM+CBDCA療法■-day1 ① ■オプジーボ（Nivolumab）（360mg/body） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 （30）分かけて ※ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用 （3週毎） ② ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ) … 1袋 ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時,ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap125mg服用 ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 （30）分かけて ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC:4.5-5） N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 （60）分かけて	■---【注射】 ■Nivo+GEM+CBDCA療法■-day8 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A N／S 50mL（大塚）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 （30）分かけて
内服	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ（80mg）「NK」 … 1cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後	