尿路上皮癌　PTX＋GEM療法（28日毎）

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 5A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】 ■パクリタキセル（PTX）（200mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （3）時間かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】 ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 【主管】 開始時・終了時 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 【主管】 開始時・終了時 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1