尿路上皮癌　Pembrolizumab＋Enfortumab Vedotin療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 ■Pembrolizumab+EV療法■-day1 ■パドセブ（EV）（1.25mg/kg、MAX125mg/body） N／S 50mL（大塚）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B （点滴）注射用蒸留水【100mL】… 1瓶 ※1V(30mg)あたり注射用水3.3mlで溶解 ※投与量が15mg/body(希釈後濃度0.3mg/ml未満)の場合は 希釈液を40mlへ減量 （30）分以上かけて ※初回のみ投与終了後30分、生食を流して経過観察 ■キイトルーダ（Pembrolizumab）（200mg/body） N／S 50mL（大塚）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 (3週毎)	■---【注射】 ■Pembrolizumab+EV療法■-day8 ■パドセブ（EV）（1.25mg/kg、MAX125mg/body） N／S 50mL（大塚）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B （点滴）注射用蒸留水【100mL】… 1瓶 ※1V(30mg)あたり注射用水3.3mlで溶解 ※投与量が15mg/body(希釈後濃度0.3mg/ml未満)の場合は 希釈液を40mlへ減量 （30）分以上かけて