大腸癌　進行再発　CPT-11+Cmab療法（14日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■CPT-11+Cmab療法■-day1 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ポララミン注5mg/1mL … 1管 ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab) 初回:400mg/㎡，2回目以降:250mg/㎡ 初回:120分，　2回目以降:60分 N/S 250mL … 1袋 全量250mLに調製 末梢点滴 … 1 ③ N／S 100mL … 1瓶 (60)分かけて 末梢点滴 … 1 ④ ■イリノテカン（CPT-11）(150mg/㎡) N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B (90)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■CPT-11+Cmab療法■-day8 N/S 250mL … 1袋 (ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ・残りは終了後に) 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ポララミン注5mg/1mL … 1管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab)(250mg/㎡) N/S 250mL … 1袋 (1)時間かけて 全量250mLに調製
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 (化学療法の翌日から2日間) 2日	