大腸癌　進行再発　FOLFIRI＋BV療法（14日毎）

	Day1
注射	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ■FOLFIRI+BV療法■ 皮下埋込型ポート … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■アバスチン(BV)（5mg/kg） N／S 100mL … 1瓶 初回：90分，2回目：60分，3回目以降：30分 皮下埋込型ポート … 1 ③ ※③は側管より同時に投与する ■イリノテカン（CPT-11）（150mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （90）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ③末梢点滴 ※③は側管より同時に投与する ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ（I-LV）（200mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■5-FU（400mg/㎡） N／S 50mL … 1B 全開、3分以内で 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■5-FU（2400mg/㎡） N／S 50mL … 1B （46）時間かけて 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法の翌日から2日間） 2日