大腸癌　進行再発　FOLFIRI＋Cetuximab療法（14日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ※開始時 皮下埋込型ポート … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ポララミン注5mg／1mL … 1管 （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ（Cmab） 初回：400mg/㎡，2回目以降：250mg/㎡ N/S 250mL … 1袋 初回：120分，　2回目以降：60分 全量250mLに調製 皮下埋込型ポート … 1 N／S 100mL … 1瓶 （60）分かけて ③ ※Cmab終了後60分間経過観察 皮下埋込型ポート … 1 ④ ※④は側管より同時に投与する ■イリノテカン（CPT-11）（150mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （90）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ④ ※④は側管より同時に投与する ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ（l-LV）（200mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■5-FU（400mg/㎡；BSA） N／S 50mL … 1B 全開、3分以内で 皮下埋込型ポート … 1 ⑥ ■5-FU（2400mg/㎡；BSA） N／S 50mL … 1B （46）時間かけて 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ※終了時 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 皮下埋込型ポート … 1 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 ※開始時 皮下埋込型ポート … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ポララミン注5mg／1mL … 1管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ（Cmab）（250mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて 全量250mLに調製 皮下埋込型ポート … 1 N／S 100mL … 1瓶 （60）分かけて ※Cmab投与終了後60分間経過観察 皮下埋込型ポート … 1 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 ※終了時
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法の翌日から2日間） 2日	