大腸癌　進行再発　S-1＋CPT-11(IRIS)療法(28日毎)

	Day1	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■イリノテカン(CPT-11)(125mg/㎡;BSA) N/S 500mL (点滴用)｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B (90)分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■イリノテカン(CPT-11)(125mg/㎡;BSA) N/S 500mL (点滴用)｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B (90)分かけて 末梢点滴 … 1
内服	■---【投薬】 ■Ｓ－１ ____～1.24m2:80mg/day/body 1.25～1.49m2:100mg/day/body 1.50m2～____:120mg/day/dody １日２回　朝夕食後 14日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 １日２回　朝昼食後 (化学療法実施の翌日から2日間) 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 １日２回　朝昼食後 (化学療法実施の翌日から2日間) 2日