大腸癌　進行再発　IRIS＋Pmab療法（28日毎）

	Day1	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ベクティビックス（Pmab）（6mg/kg） N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きルートを使用 （60）分かけて ③ ■イリノテカン（CPT-11）（125mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ベクティビックス（Pmab）（6mg/kg） N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きルートを使用 （60）分かけて ③ ■イリノテカン（CPT-11）（125mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B （90）分かけて 末梢点滴 … 1
内服	■---【投薬】 ■S－1 ＿＿＿～1.24m2：80mg/day/body 1.25～1.49m2：100mg/day/body 1.50m2～＿＿＿：120mg/day/dody 1日2回　朝夕食後 14日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法実施の翌日から2日間） 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法実施の翌日から2日間） 2日