大腸癌　進行再発　mFOLFOX6＋Cetuximab療法（14日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A ポララミン注5mg／1mL … 1管 （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab) 初回：400mg/㎡，2回目以降：250mg/㎡ N/S 250mL … 1袋 初回：120分，　2回目以降：60分 ※全量250mLになるよう調製 皮下埋込型ポート … 1 ③ N／S 100mL … 1瓶 （60）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■エルプラット（L-OHP）（85mg/㎡） （250mL）テルモ糖注　5% … 1B （2）時間かけて ※④は側管より同時に投与する 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ（l-LV）（200mg/㎡） （250mL）テルモ糖注　5% … 1B （2）時間かけて ※④は側管より同時に投与する 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■5-FU（400mg/㎡） N／S 50mL … 1B 全開、3分以内で 皮下埋込型ポート … 1 ⑥ ■5-FU（2400mg/㎡） N／S 50mL … 1B （46）時間かけて 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ※終了時 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ポララミン注5mg／1mL … 1管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab)(250mg/㎡) N/S 250mL … 1袋 （1）時間かけて ※投与終了後60分経過観察 皮下埋込型ポート … 1 N／S 100mL … 1瓶 （60）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 生食注シリンジ「NP」10mL … 1筒 ※終了時
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法の翌日から2日間） 2日	