大腸癌　進行再発　mFOLFOX6＋Pmab療法（14日毎）

	Day1
注射	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■ベクティビックス（Pmab）（6mg/kg） N／S 100mL … 1瓶 （60）分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ※終了後、生食液を15分間流す 皮下埋込型ポート … 1 ③ ■エルプラット（L-OHP）（85mg/㎡） （250mL）テルモ糖注　５% … 1B （2）時間かけて ※③は側管より同時に投与する 皮下埋込型ポート … 1 ③ ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ（I-LV）（200mg/㎡） （250mL）テルモ糖注　５% … 1B （2）時間かけて ※③は側管より同時に投与する 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■５-FU（400mg/㎡） N／S 50mL … 1B 全開、3分以内で 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■５-FU（2400mg/㎡） N／S 50mL … 1B （46）時間かけて 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法の翌日から2日間） 2日