大腸癌　進行再発　sLV5FU2＋Cetuximab療法（14日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ポララミン注5mg/1mL … 1管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab) (初回:400mg/㎡，2回目以降:250mg/㎡) N/S 250mL … 1袋 初回:120分，　2回目以降:60分 ※全量250mLになるよう調製 皮下埋込型ポート … 1 ③ N／S 100mL … 1瓶 (60)分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ(l-LV)(200mg/㎡) N/S 250mL … 1袋 (2)時間かけて 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■5-FU(400mg/㎡) N／S 50mL … 1B 全開、3分以内で 皮下埋込型ポート … 1 ⑥ ■5-FU(2400mg/㎡) N／S 50mL … 1B (46)時間かけて 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ※終了時 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ポララミン注5mg/1mL … 1管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ② ■セツキシマブ(Cmab)(250mg/㎡) N/S 250mL … 1袋 (1)時間かけて ※全量250mLになるよう調製 皮下埋込型ポート … 1 N／S 100mL … 1瓶 (60)分かけて 皮下埋込型ポート … 1 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒