胃癌　進行再発　RAM＋nab-PTX療法(28日毎)

| | Day1 | Day8 | Day15 |
|---|---|---|---|
| 注射 | ■---【注射】<br>■RAM＋nab-PTX療法■-day1<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>N／S 50mL … 1B<br>(15)分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■サイラムザ(Ram) (8mg/kg)<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>(60)分かけて<br>※RAM:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用<br>③<br>■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>末梢点滴 … 1<br>(30)分かけて<br>※nab-PTX:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄ禁止<br>※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す<br>(100mg/㎡)<br>末梢点滴 … 1<br>N／S 100mL … 1瓶<br>※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ | ■---【注射】<br>■RAM＋nab-PTX療法■-day8<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>N／S 50mL … 1B<br>(15)分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>末梢点滴 … 1<br>(30)分かけて<br>※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す<br>末梢点滴 … 1<br>N／S 100mL … 1瓶<br>※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ | ■---【注射】<br>■RAM＋nab-PTX療法■-day15<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>N／S 50mL … 1B<br>(15)分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■サイラムザ(Ram) (8mg/kg)<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>(60)分かけて<br>※RAM:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄを使用<br>③<br>■アブラキサン(nab-PTX) (100mg/㎡)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>末梢点滴 … 1<br>(30)分かけて<br>※nab-PTX:ﾌｨﾙﾀｰ付きﾙｰﾄ禁止<br>※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す<br>末梢点滴 … 1<br>N／S 100mL … 1瓶<br>※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ |