乳癌　進行　Pembrolizumab＋GEM+CBDCA療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 ■Pembro+GEM+CBDCA療法■-day1 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸ 3mg/50mL(ｹﾓ用) … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■キイトルーダ（Pembrolizumab）（200mg/body） N／S 50mL（大塚）ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B 末梢点滴 … 1 （30）分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 （30）分かけて ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：2） N/S 250mL「ﾌｿｰ」… 1袋 末梢点滴 … 1 （60）分かけて	■---【注射】 ■Pembro+GEM+CBDCA療法■-day8 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸ 3mg/50mL(ｹﾓ用) … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 （30）分かけて ③ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：2） N/S 250mL「ﾌｿｰ」… 1袋 末梢点滴 … 1 （60）分かけて
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 1日1回　朝食後 （化学療法実施の翌日から2日間）	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 1錠 1日1回　朝食後 （化学療法実施の翌日から2日間）