乳癌　進行再発　wPTX＋Bmab療法(28日毎)

| | Day1 | Day8 | Day15 |
|---|---|---|---|
| 注射 | ■---【注射】<br>末梢点滴 … 1<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL (ｶﾞｽﾀｰ注) … 1管<br>N／S 50mL … 1B<br>(30)分かけて<br>※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■パクリタキセル(PTX)(90mg/㎡)<br>N/S 250mL … 1袋<br>(60)分かけて<br>※インラインフィルター付きのルートを使用<br><br>末梢点滴 … 1<br>③<br>■アバスチン(BV) (10mg/kg)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>初回:90分, 2回目:60分, 3回目-:30分 | ■---【注射】<br>末梢点滴 … 1<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL (ｶﾞｽﾀｰ注) … 1管<br>N／S 50mL … 1B<br>(30)分かけて<br>※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■パクリタキセル(PTX)(90mg/㎡)<br>N/S 250mL … 1袋<br>(60)分かけて<br>※インラインフィルター付きのルートを使用 | ■---【注射】<br>末梢点滴 … 1<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL (ｶﾞｽﾀｰ注) … 1管<br>N／S 50mL … 1B<br>(30)分かけて<br>※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用<br>末梢点滴 … 1<br>②<br>■パクリタキセル(PTX)(90mg/㎡)<br>N/S 250mL … 1袋<br>(60)分かけて<br>※インラインフィルター付きのルートを使用<br>末梢点滴 … 1<br>③<br>■アバスチン(BV) (10mg/kg)<br>N／S 100mL … 1瓶<br>初回:90分, 2回目:60分, 3回目-:30分 |