膵臓癌　進行再発　nab-PTX＋GEM療法(28日毎)

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン(nab-PTX) (125mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ ③ ■ゲムシタビン(GEM) (1000mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン(nab-PTX) (125mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ ③ ■ゲムシタビン(GEM) (1000mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■アブラキサン(nab-PTX) (125mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※1VをNS20mlで溶解，必要量をﾊﾞｯｸﾞへ戻す ※ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ終了後は生食を流してﾌﾗｯｼｭ 末梢点滴 … 1 N／S 100mL … 1瓶 ※　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用　※ ③ ■ゲムシタビン(GEM) (1000mg/㎡) N／S 100mL … 1瓶 末梢点滴 … 1 (30)分かけて