胆道癌　GEM＋CDDP療法（21日毎）

		Day1	Day8
投薬	点滴・注射薬	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ランダ（CDDP）（25mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 静脈内注射 … 1 ④ フロセミド注20mg/2mL（ﾗｼｯｸｽ注 … 1 管	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ① ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL「NK … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ランダ（CDDP） … （25mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 静脈内注射 … 1 ④ フロセミド注20mg/2mL（ﾗｼｯｸｽ注 … 1 管
	内服薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日