食道癌　S-1＋CDDP療法（21日毎）

	Day1
注射	■---【注射】 ■食道癌 S-1＋CDDP療法■-day1 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 (2)時間かけて 末梢点滴 … 1 ② プロイメンド点滴静注150mg … 1瓶 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A N／S 100mL … 1瓶 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (30)分かけて 末梢点滴 … 1 ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 (60)分かけて 末梢点滴 … 1 200ml投与 ⑤ ■ランダ（CDDP）(60mg/㎡) N/S 500mL（点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣… 1B (90)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑥ N/S 500mL（点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣… 1B (60)分かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて
内服	■---【投薬】 ■Ｓ－１ ＿＿＿～1.24m2：80mg/day/body 1.25～1.49m2：100mg/day/body 1.50m2～＿＿＿：120mg/day/dody １日２回　朝夕食後 14日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 １日２回　朝昼食後 （点滴施行の翌日より3日間） 3日