ホジキンリンパ腫　A+AVD療法（28日毎）

	Day1	Day15
注射	ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL オルガドロン注射液3.8mg　3A （15）分かけて ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 末梢点滴 アドリアシン（ADM）（25mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴 エクザール（VBL） （6mg/㎡）（MAX 10mg/body） N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴 ダカルバジン(DTIC)（375mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 【遮光】 末梢点滴 ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ（Brentuximab Vedotin） （1.2mg/kg）(MAX 120mg/body) N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴	ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL オルガドロン注射液3.8mg 3A （15）分かけて ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 末梢点滴 アドリアシン（ADM）（25mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴 エクザール（VBL） （6mg/㎡）(MAX 10mg/body) N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴 ダカルバジン(DTIC)（375mg/㎡） N／S 100mL （30）分かけて 【遮光】 末梢点滴 ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ（Brentuximab Vedotin） （1.2mg/kg）(MAX 120mg/body) N／S 100mL （30）分かけて 末梢点滴
内服	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 ﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠4mg … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap （化学療法実施の翌日から2日間） 1日1回　朝食後 ﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠4mg … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後