悪性リンパ腫　Bendamustine療法（21日毎）

| | | Day1 | Day2 |
|---|---|---|---|
| 投薬 | 点滴・注射 | ■---【注射】<br>末梢点滴 … 1<br>■Bendamustine療法　day1■<br>【主管】<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①【側管】<br>ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 1A<br>（15）分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②【側管】<br>■トレアキシン（bendamustine）（120mg/㎡）<br>N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B<br><br>（2）時間かけて<br>※溶解後3時間以内に投与を終了<br>※1Vを注射用水40mlで溶解(ﾌｧｼｰﾙ使用)<br>末梢点滴 … 1<br>（点滴用） 注射用蒸留水　500ml … 1V<br>※トレアキシン溶解用 | ■---【注射】<br>末梢点滴 … 1<br>■Bendamustine療法　day2■<br>【主管】<br>N/S 250mL … 1袋<br>末梢点滴 … 1<br>①【側管】<br>▼オルガドロン注射液3.8mg … 1A<br>N／S 50mL … 1B<br>（15）分かけて<br>末梢点滴 … 1<br>②【側管】<br>■トレアキシン（bendamustine）（120mg/㎡）<br>N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B<br><br>（2）時間かけて<br>※溶解後3時間以内に投与を終了<br>※1Vを注射用水40mlで溶解(ﾌｧｼｰﾙ使用)<br>末梢点滴 … 1<br>（点滴用） 注射用蒸留水　500ml … 1V<br>※トレアキシン溶解用 |