悪性リンパ腫　G+Bendamustine療法(28日毎)　※ 2クール目以降はDay1、Day2のみ

	Day1	Day2	Day8	Day15
投薬　点滴	ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 125mg N／S 100mL (30)分かけて ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与1時間前に投与 ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 ガザイバ(Obinutuzumab) … 1000mg N/S 250mL 初回　12.5ml/h 30分 以後、30分毎に12.5ml/hづつUPし 最大100ml/hr ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL オルガドロン注射液3.8mg (30)分かけて トレアキシン(bendamustine) (90mg/㎡) N/S 250mL (1)時間かけて	オルガドロン注射液3.8mg N／S 50mL (15)分かけて トレアキシン(bendamustine) (90mg/㎡) N/S 250mL (1)時間かけて	ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 125mg) N／S 100mL (30)分かけて ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与1時間前に投与 ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 ガザイバ(Obinutuzumab) … 1000mg N/S 250mL 25ml/h 30分より開始 以後、30分毎に25ml/hrづつUPし 最大100ml/hr	ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg N／S 100mL (30)分かけて ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与1時間前に投与 ※ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与30分前 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 ガザイバ(Obinutuzumab) … 1000mg N/S 250mL 25ml/h 30分より開始 以後、30分毎に25ml/hrづつUPし 最大100ml/hr