悪性リンパ腫　HD-MTX療法（14日毎）

	Day1	Day2	Day3
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】① 80ml／h ■HD-MTX療法■-day1 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】② 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】③ 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】④ 80ml／h 末梢点滴 … 1 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 (15)分かけて 【側管】① 末梢点滴 … 1 ■高濃度ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ（MTX）（3500mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 (2)時間かけて 【側管】② ※全量が250mLになるよう調製 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて ※MTX開始12時間後より6時間毎 計8回(1/8)	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】① 80ml／h ■HD-MTX療法■-day2 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】② 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】③ 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】④ 80ml／h 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(2/8) 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(3/8) 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(4/8) 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(5/8) 末梢点滴 … 1 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B 開始時間：10時0分 (15)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】① 80ml／h ■HD-MTX療法■-day3 末梢点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】② 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】③ 80ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】④ 80ml／h 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(6/8) 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(7/8) 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B (15)分かけて 【側管】6時間毎に(8/8) 末梢点滴 … 1 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B 開始時間：10時0分