悪性リンパ腫　MA療法（21日毎）

	Day1	Day2	Day3
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h ■MA療法■-day1 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 【側管】① 末梢点滴 … 1 ■高濃度ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ（MTX）（200mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 【側管】② 末梢点滴 … 1 ■高濃度ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ（MTX）（800mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B （22）時間かけて 【側管】③ 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて ※MTX開始12時間後より6時間毎 計8回(1/8)	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h ■MA療法■-day2 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 ■キロサイド（Ara-C）（2000mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 【側管】① 末梢点滴 … 1 ■キロサイド（Ara-C）（2000mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 【側管】② ※①の12時間後に投与 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（2/8） 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（3/8） 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（4/8） 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（5/8）	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h ■MA療法■-day3 末梢点滴 … 1 ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液 500mL … 1袋 メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B メイロン静注8.4% 20mL … 1A 【主管】 60ml／h 末梢点滴 … 1 ■キロサイド（Ara-C）（2000mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 【側管】① 末梢点滴 … 1 ■キロサイド（Ara-C）（2000mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 【側管】② ※①の12時間後に投与 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（6/8） 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（7/8） 末梢点滴 … 1 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注　3mg 1mL … 5管 N／S 50mL … 1B （15）分かけて 【側管】6時間毎に（8/8）